

Jämförelse ADHD PTSD
ADHD "kärnsymtom" PTSD DSM-IV

PTSD ICD-10

<p>Ouppmärksamhet</p>	<p>B 3 handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en känsla att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa flashbackupplevelser, B 4 Intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. C 1 Aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat. D Ihållande symtom av överspändhet D 3 Koncentrationssvårigheter D 4 överdriven vaksamhet. D 5 lättskrämthet</p>	<p>B återupplevande av den belastande händelsen såsom återtrippar (flashbacks), levande minnen, C verkligt eller önskat undvikande av omständigheter som påminner om eller associerar till den belastande händelsen. D koncentrationssvårigheter</p>
<p>Hyperaktivitet/impulsivitet</p>	<p>B 3 handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en känsla att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer och dissociativa flashbackupplevelser, B 4 Intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. B 5 fysiologiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. D 2 irriterabilitet eller vredesutbrott.</p>	<p>D Ihållande symtom på ökad psykologisk sensitivitet och arousal, som inte fanns före expositionen hypervigilans (vara på sin vakt, i spänd uppmärksamhet) förstärkt "startle response", skrämnelreaktioner</p>
<p>Utagerande beteende</p>	<p>B 3. handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt C 2 aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av traumat. C 4 klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter. C 5 känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor. C 6 begränsade affekter (t ex oförmåga att känna kärlek). D 2 irriterabilitet eller vredesutbrott. D 4 överdriven vaksamhet.</p>	<p>D Ihållande symtom på ökad psykologisk sensitivitet och arousal irriterabilitet eller utbrott av ilska hypervigilans (vara på sin vakt, i spänd uppmärksamhet) förstärkt "startle response", skrämnelreaktioner</p>